AVERTISSEMENTS6-80689179 BULLETIN TECHNIQUE AGRICOLES

TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

"UBLICATION PÉRIODIQUE -

EDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD . HERAULT . LOZERE . PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL J76 MON PELLIER CEDEX - TEL. 92.41.42

ABONNEMENT ANNUEL: Régisseur de recettes de la D.D.A. C.C.P. Montpellier 5238-57

6 juin 1980

BULLETIN N° 9 destiné aux agriculteurs du Lauragais producteurs de CEREALES

Les blés restent généralement très sains.

- La Rouille jaune demeure rare : elle n'a été découverte qu'à un niveau faible et dans cinq champs seulement.

Par contre:

- 30 % des champs de blé tendre visités sont colonisés par les pucerons alors que 10 % des surfaces cultivées ont atteint le seuil de sensibilité à partir duquel un traitement s'avère nécessaire.

Observez vos champs. Traitez lorsque vous trouvez un épi sur deux colonisé par au moins un puceron. Utilisez Pirimor G (0,250 kg/ha). Ce traitement demeurera rentable tant que les grains n'ont pas atteint leur taille définitive.

- De nombreux champs de Roazon présentent un début d'attaque d'Oïdium sur épis qui pourrait nuire sensiblement à la qualité des grains récoltés.

Nous renouvelons notre recommandation de traitement . On choisira :

"Bayleton 25" - à 0,5 kg/ha "Calixine M" à 5 kg/ha

Soyez très attentifs aux invasions de pucerons sur épis.

L'INGÉNIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE, CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

V.LAGAUDE

Tirage du 6 juin 1980 1100 exemplaires